

# PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

## Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

**CARGO:**

**MÉDICO CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA - 116**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_



---

### Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

### Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

### Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitário tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitário e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

### Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

---

### Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

### Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

### Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

### Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

### Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

---

### Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento.
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

### Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

### Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

### Questão 13

São anomalias comuns associadas à tetralogia de Fallot:

- A) atresia tricuspíde e drenagem anômala de veias pulmonares.
- B) coarctação da aorta e transposição de grandes artérias.
- C) truncus arteriosus e comunicação interatrial.
- D) origem anômala de coronária e arco aórtico para a direita.

---

**Questão 14**

No recém-nascido com transposição das grandes artérias, a conduta **correta** é

- A) iniciar digital e diurético via endovenosa.
- B) encaminhar urgente para cirurgia de Senning.
- C) entubar a criança e colocá-la em ventilação mecânica c/ O<sub>2</sub> a 100%.
- D) iniciar prostaglandina endovenosa para abrir o canal arterial.

**Questão 15**

No defeito átrio-ventricular total do tipo a de Rastelli, as cordas da válvula átrio-ventricular única se inserem

- A) na parede livre do ventrículo esquerdo.
- B) na parede livre do ventrículo direito.
- C) no topo do septo atrioventricular.
- D) na via de saída do ventrículo esquerdo.

**Questão 16**

No defeito do septo átrio ventricular, o termo “goose neck” (pescoço de ganso), à angiografia, representa

- A) via de saída alongada do ventrículo esquerdo.
- B) válvula átrio ventricular única.
- C) dilatação de troncos e ramos pulmonares.
- D) insuficiência da válvula tricúspide.

**Questão 17**

A lesão cardíaca mais encontrada na síndrome de Willams é

- A) estenose aórtica supraavalar.
- B) comunicação interatrial.
- C) comunicação interventricular.
- D) coarctação da aorta.

**Questão 18**

A lesão comum na síndrome de Turner é

- A) comunicação interventricular.
- B) coarctação da aorta.
- C) transposição das grandes artérias.
- D) anomalias de Ebstein.

---

### Questão 19

A lesão comum na síndrome de Noonan é

- A) transposição das grandes artérias.
- B) estenose pulmonar.
- C) tetralogia de Fallot.
- D) drenagem anômala de veias pulmonares.

### Questão 20

No isomerismo atrial direito, encontramos

- A) coarctação da aorta.
- B) tetralogia de Fallot.
- C) drenagem anômala de veias pulmonares.
- D) anomalia de Ebstein.

### Questão 21

Recém-nascido apresentando quadro de taquidispnéia importante, má perfusão periférica, sudorese e ausência de pulsos em membros inferiores. A conduta **correta** é

- A) atrioseptostomia.
- B) iniciar indometacina EV.
- C) iniciar prostaglandina EV.
- D) digital e diurético endovenoso.

### Questão 22

A etiologia mais comum de miocardite em crianças é

- A) tuberculosa.
- B) bacteriana.
- C) viral.
- D) fúngica.

### Questão 23

São causas da insuficiência cardíaca no recém-nascido:

- A) anóxia neonatal e septicemia.
- B) comunicação interventricular e comunicação interatrial.
- C) estenose pulmonar e tetralogia de Fallot.
- D) transposição das grandes artérias e comunicação interatrial.

---

**Questão 24**

Na estenose pulmonar valvar,

- A) está indicado o tratamento cirúrgico com gradiente acima de 30mmHg.
- B) a valvuloplastia por balão é o tratamento de eleição.
- C) a presença de comunicação interatrial associada não contra-indica a valvuloplastia.
- D) enquanto aguarda a cirurgia, a criança necessita fazer uso de digital e diurético para manter-se hemodinamicamente.

**Questão 25**

Os defeitos do coxín endocárdico são encontrados com frequência nas crianças portadoras de qual síndrome ?

- A) Rubéola congênita.
- B) Turner.
- C) Edwards.
- D) Down.

**Questão 26**

A presença de sinusóides se encontra em

- A) comunicação interventricular.
- B) transposição das grandes artérias.
- C) tetralogia de Fallot.
- D) atresia pulmonar com septo íntegro.

**Questão 27**

No período fetal, qual a estrutura por onde chega a maior quantidade de sangue às câmaras cardíacas esquerdas?

- A) Veias pulmonares.
- B) Canal arterial.
- C) Ducto venoso.
- D) Forame oval.

**Questão 28**

A queda da resistência arterial pulmonar no período Neo-Natal se deve à

- A) insuflação dos pulmões + aberturas de novos vasos + aumento da tensão de oxigênio.
- B) insuflação do pulmões + ligadura do cordão umbilical + aumento da tensão de oxigênio.
- C) ligadura do cordão umbilical + aumento da tensão de oxigênio + fechamento do canal arterial.
- D) ligadura do cordão umbilical + fechamento do canal arterial + fechamento do ducto venoso.



---

**Questão 29**

Os últimos exames laboratoriais a se normalizarem na fase aguda da febre reumática e que servem como critério de cura laboratorial são

- A) proteína-C-reativa e fração alfa2 globulina.
- B) mucoproteínas e anti-estreptolisina O (ASLO).
- C) mucoproteínas e fração alfa2 globulina.
- D) proteína-C-reativa e VSH.

**Questão 30**

Em paciente com febre reumática com acometimento cardíaco na fase aguda e que não evolui para seqüela cardíaca, a profilaxia secundária deve estender-se

- A) até 25 anos de idade ou por período mínimo de 5 anos.
- B) até 25 anos de idade ou por período mínimo de 10 anos.
- C) até 18 anos de idade ou por período mínimo de 5 anos.
- D) por período indeterminado ou pelo menos até 40 anos de idade.

**Questão 31**

Na Comunicação Interatrial com fluxo pulmonar moderado, a ausculta cardíaca caracteriza-se por

- A) desdobramento amplo e fixo da segunda bulha + sopro sistólico ejetivo em borda esternal esquerda alta.
- B) desdobramento amplo e variável da segunda bulha + sopro sistólico ejetivo em borda esternal esquerda alta.
- C) desdobramento paradoxal da segunda bulha + sopro sistólico ejetivo em borda esternal esquerda alta.
- D) desdobramento paradoxal da segunda bulha + hipofonese do componente pulmonar da segunda bulha.

**Questão 32**

Na comunicação interventricular com grande defeito, em que o tratamento clínico não trouxe resultados satisfatórios, deve-se recorrer à cirurgia precoce quando houver

- A) crescimento inadequado, infecções de repetição e pressão elevada na artéria pulmonar.
- B) crescimento inadequado, arritmia cardíaca e pressão elevada na artéria pulmonar.
- C) infecção de repetição, arritmia cardíaca e pressão elevada na artéria pulmonar.
- D) arritmia cardíaca, crescimento inadequado e intolerância à digital.

---

**Questão 33**

O tratamento cirúrgico preferencial da comunicação interventricular com defeito isolado de moderado a grande tamanho é

- A) bandagem da artéria pulmonar.
- B) fechamento primário do defeito.
- C) cirurgia de Fontan.
- D) cirurgia de Glenn.

**Questão 34**

Qual o achado histopatológico característico da fase proliferativa da febre reumática aguda?

- A) O corpúsculo de Bracht-Wachter.
- B) O nódulo de Osler.
- C) O nódulo de Aschoff.
- D) Depósito de substância amilóide.

**Questão 35**

A causa principal da pericardite constrictiva é

- A) pericardite reumática.
- B) pericardite viral.
- C) pericardite idiopática.
- D) pericardite tuberculosa.

**Questão 36**

Na hipertensão arterial pulmonar primária, os preditores confiáveis de morte precoce são

- A) arritmias cardíacas e insuficiência cardíaca direita.
- B) baixo débito cardíaco e arritmias cardíacas.
- C) baixo débito cardíaco e sinais de insuficiência cardíaca direita.
- D) hemoptise e insuficiência cardíaca direita.

**Questão 37**

Na Comunicação Interatrial (CIA) tipo seio venoso, ocorre geralmente associação com

- A) persistência da veia cava superior esquerda.
- B) drenagem anômala parcial das veias pulmonares.
- C) persistência do canal arterial.
- D) fendas na cúspide anterior da válvula mitral.

---

**Questão 38**

A ausência do forame oval no período fetal, é uma das causas de

- A) síndrome de Edwards.
- B) síndrome de hipoplasia do ventrículo esquerdo.
- C) síndrome de Holt-Orah.
- D) síndrome de Noonan.

**Questão 39**

Qual é a cardiopatia congênita que está relacionada à insuficiência valvar aórtica?

- A) Persistência do canal arterial.
- B) Comunicação interventricular perimembranosa.
- C) Coarctação de aorta.
- D) Comunicação interventricular subarterial.

**Questão 40**

A imagem radiológica “ovo deitado e pedículo estreito” corresponde à (ao)

- A) anomalia total das veias pulmonares.
- B) tetralogia de Fallot.
- C) transposição das grandes artérias.
- D) truncus arteriosus.