

# PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

## Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

**CARGO:**

**MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA - 119**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_



---

---

### Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

### Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

### Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitista tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitista e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

### Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

---

### Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

### Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

### Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

### Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

### Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

---

### Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento.
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

### Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

### Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

### Questão 13

A conduta cirúrgica em um lactente com torção de testículo e sofrimento circulatório de média intensidade deve ser

- A) orquiectomia.
- B) orquiectomia e fixação do outro testículo.
- C) redução da torção, fixação do outro testículo e corticóide sistêmico.
- D) redução da torção e fixação do outro testículo.

---

**Questão 14**

Ultra-som materno, na 22<sup>a</sup>. semana, revelou a presença de hérnia diafragmática esquerda, sem polihidrâmnios. A conduta é

- A) após amadurecimento pulmonar comprovado por amniocentese, interromper a gravidez para cirurgia da hérnia.
- B) interromper a gravidez.
- C) cirurgia fetal.
- D) tentar conduzir a gestação até pelo menos a 37<sup>a</sup>. semana e avaliar o recém-nascido após o nascimento para decidir o tratamento.

**Questão 15**

A principal causa de mortalidade na atresia do esôfago está relacionada à(s)

- A) prematuridade.
- B) pneumonia.
- C) anomalias associadas.
- D) deiscência total da anastomose esofágica.

**Questão 16**

Assinale a opção que determina a conduta mais importante no diagnóstico da apendicite aguda.

- A) Exame físico.
- B) Tomografia computadorizada do abdome.
- C) Ultra-sonografia do abdome.
- D) Leucograma.

**Questão 17**

Recém-nascido, no 5<sup>o</sup> dia de pós-operatório de cura cirúrgica de atresia do esôfago com fístula distal por via extrapleural, apresenta eliminação de saliva pelo dreno torácico. Esofagograma comprova deiscência da anastomose esofágica. A conduta ideal é

- A) tratamento da infecção, medidas suportivas, gastrostomia para drenagem e suporte nutricional por jejunostomia ou por nutrição parenteral.
- B) toracotomia e reanastomose esofágica.
- C) toracotomia, ligadura do coto distal e esofagostomia cervical.
- D) antibioticoterapia, medidas suportivas, nutrição parenteral e manutenção da SNG para aspiração gástrica.

---

**Questão 18**

Não é considerada manifestação clínica do neuroblastoma:

- A) nódulos subcutâneos.
- B) hematúria.
- C) hipertensão arterial.
- D) tumor maligno com potencial de cura estimado em até 10%.

**Questão 19**

É **correto** afirmar que

- A) a pneumatose intestinal associada ao portograma aéreo é indicação cirúrgica na enterocolite necrosante do recém-nascido.
- B) o cariótipo encontrado na Síndrome da Persistência dos Ductos de Muller é XY.
- C) a complicação mais comum do higroma cístico é dispnéia.
- D) os resultados da cirurgia de Peña em relação à continência anal independem do tipo de anatomia anorretal.

**Questão 20**

A presença de testículo feminilizante pode ser evidenciado no decorrer de

- A) orquidopexia para criptorquidia.
- B) biopsia testicular em casos de torção de testículo.
- C) herniorrafia inguinal em menina.
- D) ooforopexia em casos de torção de ovário.

**Questão 21**

A principal causa de mortalidade por hérnia diafragmática de Bochdaleck é

- A) hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido.
- B) prematuridade.
- C) hipoplasia pulmonar bilateral.
- D) diagnóstico tardio.

**Questão 22**

A síndrome de Down está mais freqüentemente associada à(ao)

- A) atresia ileal.
- B) megacólon congênito.
- C) atresia duodenal.
- D) ânus imperfurado.

---

### Questão 23

Em relação à invaginação intestinal, é **incorreto** afirmar que

- A) o enema opaco normal exclui o diagnóstico.
- B) atinge de preferência o sexo masculino na proporção de 3/1.
- C) nem sempre a redução hidrostática é possível.
- D) está indicada laparotomia, quando houver dúvida quanto à redução hidrostática.

### Questão 24

Em relação ao refluxo vésico-ureteral (RVU) primário na criança, é **correto** afirmar que

- A) o RVU primário é danoso ao rim, mesmo na ausência de infecção.
- B) as cicatrizes pielonefríticas conseqüentes são mais freqüentes nos primeiros anos de vida.
- C) é mais comum no sexo masculino.
- D) o tratamento cirúrgico (reimplante), quando bem realizado, oferece 75% de cura.

### Questão 25

Durante laparotomia por trauma abdominal fechado, encontramos o pâncreas completamente seccionado na junção do corpo e cauda. O tratamento deve ser

- A) implante de ambas as superfícies de secção em alça jejunal excluída.
- B) pancreatectomia subtotal.
- C) anastomose do ducto pancreático e sutura da cápsula.
- D) pancreatectomia distal à lesão e sutura da superfície de secção do segmento proximal.

### Questão 26

Mediante um quadro clínico de síndrome escrotal aguda, é **correto** afirmar que

- A) um quadro clínico evidente é suficiente para indicar a exploração cirúrgica.
- B) o exame ultra-sonográfico isolado permite que se faça um diagnóstico diferencial.
- C) a orquiepididimite não pode ser causada por um ureter ectópico.
- D) é mais comum a torção intravaginal em recém-nascido e, na criança maior, a torção extravaginal.

### Questão 27

O tratamento de escolha da atresia duodenal é

- A) duodenostomia com anastomose tardia.
- B) duodeno-jejunostomia.
- C) gastro-jejunostomia.
- D) duodeno-duodenostomia.



---

### Questão 28

Assinale o exame de escolha mais importante no diagnóstico da invaginação.

- A) Ultra-sonografia de abdome total.
- B) Radiografia simples do abdome.
- C) Exame físico.
- D) Enema opaco.

### Questão 29

É **correto** afirmar:

- A) a válvula de uretra posterior tem excelente prognóstico quando diagnosticada precocemente na gestação por ultra-sonografia fetal e com concomitante oligohidramnia.
- B) o lobo mais acometido é o superior direito, no enfisema lobar congênito.
- C) as anomalias do epidídimo são freqüentes na criptorquidia.
- D) quando o testículo criptorquídico é impalpável, a possibilidade de ele encontrar-se viável no abdome é próximo a 98%.

### Questão 30

Com relação à onfalocele e à gastrosquise, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Na presença da síndrome de Beckwith-Wiedeman, existe uma maior incidência de hipoglicemia no período neo-natal.
- B) A síndrome de Beckwith-Wiedeman é associada à gastrosquise.
- C) A taxa de mortalidade maior nas onfaloceles está relacionada a anomalias associadas.
- D) O fechamento primário na gastrosquise obriga, com freqüência, a manter o paciente em assistência ventilatória.

### Questão 31

A opção ideal no tratamento cirúrgico do cisto do colédoco é

- A) ressecção do cisto e hepaticojejunostomia em Y de Roux.
- B) cistojejunostomia em Y de Roux.
- C) cistoduodenostomia.
- D) ressecção da camada interna do cisto e hepaticojejunostomia em Y de Roux (operação de Lilly).

---

**Questão 32**

Em relação à atresia do esôfago sem fístula distal, assinale a opção **incorreta**.

- A) O tratamento inicial deve ser: gastrostomia e esofagostomia cervical.
- B) O diagnóstico pode ser feito através do ultra-som materno.
- C) O tratamento inicial deve ser gastrostomia e aguardar o alongamento natural do coto proximal para anastomose esofágica.
- D) A tentativa de anastomose esofágica primária não deve ser tentada, em virtude da grande distância normalmente existente entre os dois cabos do esôfago.

**Questão 33**

A hipótese mais aceitável para justificar a ocorrência de icterícia no quadro clínico da estenose hipertrófica do piloro é

- A) aumento da pressão abdominal.
- B) diminuição da atividade da enzima glucoronil-transferase.
- C) são das vias biliares extra-hepáticas.
- D) diminuição da glicose-6-fosfatase.

**Questão 34**

Em relação à hérnia inguinal, assinale a opção **incorreta**.

- A) Nos meninos, a hérnia mais freqüente é à direita.
- B) O encarceramento de ovário é freqüente.
- C) Nos meninos, a hérnia inguinal direta incide em 10% dos casos.
- D) Na hérnia inguinal estrangulada, é freqüente a isquemia do testículo.

**Questão 35**

Com relação às características da aganglionose total do cólon, assinale a opção **incorreta**.

- A) Enema sugerindo colo encurtado com morfologia em sinal de interrogação.
- B) Alternância entre episódios de diarreia e obstipação.
- C) Raio X simples com distensão de alças de delgado.
- D) Zona de transição situada na região da válvula ileocecal no ato cirúrgico.

---

### Questão 36

Criança com 8 anos sofreu trauma abdominal fechado e foi submetida à esplenectomia parcial, permanecendo com 20% do baço. Em relação ao risco de desenvolver sépsis grave,

- A) encontra-se na faixa etária de maior risco.
- B) o risco não se altera.
- C) necessita de profilaxia antibiótica e imunização, apesar do baço remanescente.
- D) tem risco maior após 2 anos de esplenectomia.

### Questão 37

Criança com trauma abdominal há 48 horas por queda de tanque sobre o abdome. Apresenta dor em epigástrio e hipocôndrio direito, vômitos biliosos persistentes, abaulamento epigástrico e imagem radiológica contrastada, em que se observa sub-oclusão duodenal. A melhor conduta será

- A) cirúrgica com derivação duodeno-duodenal.
- B) conservador com sonda naso-gástrica e nutrição parenteral.
- C) cirúrgica com derivação duodeno-jejunal.
- D) conservador por 2 dias; se não houver melhora, cirurgia para esvaziamento do hematoma.

### Questão 38

Um recém-nascido, portador de atresia do esôfago em sua forma mais comum e pneumonia aspirativa, é submetido à gastronomia e aguarda melhores condições respiratórias para a toracotomia. Para manter seu estado nutricional, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Nutrição parenteral central.
- B) Alimentação por gastrostomia.
- C) Nutrição parenteral periférica.
- D) Alimentação enteral por jejunostomia.

### Questão 39

Lactente de 2 meses, eutrófico, portador de megaureter primário à direita com diagnóstico fetal e confirmado ao nascimento por US que demonstrou espessura renal normal e ureter todo dilatado até a sua porção terminal. Rim esquerdo sem alteração. A uretrocistografia miccional demonstrou refluxo grau II para o ureter contralateral. O renograma com DTPA demonstrou curva obstrutiva à direita, com função relativa de 45%. Assinalar a conduta correta.

- A) Nefrostomia direita.
- B) Ureterostomia cutânea à direita.
- C) Reimplante ureteral direito.
- D) Conduta conservadora e seguimento.

---

**Questão 40**

Com relação à cirurgia de KASAI, no tratamento da atresia biliar, é **correto** afirmar que

- A) a colangite raramente acontece, se a cirurgia for realizada com êxito.
- B) a possibilidade de sucesso é maior quando realizada depois dos 3 meses de idade, pois os dutos biliares são mais largos.
- C) cirrose hepática e hipertensão portal são freqüentes, apesar da cirurgia.
- D) a cirurgia, inicialmente, não é indicada, se for possível o transplante hepático.

