

# PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

## Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

### CARGO: MÉDICO NEONATOLOGIA - 129

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_



---

---

### Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

### Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

### Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitarista tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitarista e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

### Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

---

### Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

### Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

### Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

### Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

### Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

---

### Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento.
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

### Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

### Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

### Questão 13

Durante a reanimação de um recém-nascido na sala de parto, foi diagnosticada apnéia e frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. Qual a conduta **correta**?

- A) Ventilar com pressão positiva com O<sub>2</sub> a 100%, iniciar massagem cardíaca e, após 30 segundos, considerar a possibilidade de adrenalina.
- B) Ventilar com pressão positiva com O<sub>2</sub> a 100% e iniciar massagem cardíaca.
- C) Ventilar com pressão positiva com O<sub>2</sub> a 100% e, após 30 segundos, iniciar massagem cardíaca.
- D) Ventilar com pressão positiva com O<sub>2</sub> a 100%.

---

**Questão 14**

Em relação à paralisia braquial de Erb-Duchenne, assinale a opção **incorreta**.

- A) Estão afetados os reflexos de Moro, bicipital e radial.
- B) Ocorre lesão das raízes espinhais do plexo braquial superior (C5 e C6).
- C) O reflexo da preensão está intacto.
- D) Afeta os músculos intrínsecos da mão, flexores do punho e dedos.

**Questão 15**

Em relação à reanimação neonatal, assinale a opção **correta**.

- A) A aspiração de mecônio da traquéia deve ser realizada com sonda de aspiração traqueal de número 12 ou 14.
- B) Se o mecônio está presente e o recém-nascido está vigoroso, a aspiração traqueal deve preceder qualquer outra manobra de reanimação.
- C) Os recém-nascidos com líquido amniótico meconial devem ser submetidos à aspiração da faringe antes do desprendimento dos ombros.
- D) A necessidade de aspiração de mecônio da traquéia é baseada na consistência do mecônio.

**Questão 16**

Qual volume de troca (mL) que deve ser utilizado ao se realizar uma exsangüíneotransfusão parcial no tratamento de policitemia sintomática em um recém-nascido a termo de 3 Kg, que apresenta hematócrito venoso de 75%, para trazer o hematócrito para 55%?

- A) 64 mL
- B) 100 mL
- C) 87 mL
- D) 48 mL

**Questão 17**

Assinale a opção que define o fator de risco mais importante para o aparecimento da enterocolite necrosante.

- A) Prematuridade.
- B) Policitemia.
- C) Anóxia Perinatal.
- D) Infecção.

---

### Questão 18

Em relação à síndrome da secreção inapropriada do hormônio anti-diurético, assinale a opção **incorreta**.

- A) Pode ser causada por asfixia perinatal.
- B) Ocorre redução do débito urinário, hiponatremia associada à osmolaridade urinária baixa.
- C) A restrição hídrica é útil no tratamento.
- D) Pneumotórax, enfisema intersticial pulmonar, ventilação mecânica e perda sangüínea aguda podem ser causa dessa síndrome.

### Questão 19

Assinale a alternativa que define a opção **correta**.

- 1 - No Pneumotórax espontâneo pequeno, em que o recém-nascido não apresenta desconforto respiratório, a conduta deve ser expectante.
  - 2 - No pneumotórax não hipertensivo sintomático, utiliza-se o oxigênio a 100%.
  - 3 - No pneumotórax hipertensivo com desconforto respiratório importante, deve-se proceder à drenagem torácica.
- A) 2 e 3.
  - B) 1, 2 e 3.
  - C) 1 e 3.
  - D) 1 e 2.

### Questão 20

Você recepciona, na sala de parto, um recém-nascido pesando 2.700 gramas, a termo, nascido de mãe HBsAG positiva. O recém-nascido apresenta exame físico normal e está clinicamente saudável. Qual das condutas abaixo você consideraria adequadas para a profilaxia da hepatite B, nesse recém-nascido?

- 1 - Separar a criança da sua mãe até que ela se torne HBsAg negativa e HBeAG negativa.
- 2 - Aplicar vacina contra hepatite B, com 1 mês e com 6 meses de idade.
- 3 - Empregar imunoglobulina para hepatite B (IGHB) na criança, de preferência hiperimune.
- 4 - Evitar soluções de continuidade na pele ou mucosas do recém-nascido.

Assinale abaixo a opção com as condutas **corretas**.

- A) Apenas 1, 3 e 4.
- B) Apenas 2, 3 e 4.
- C) Apenas 3 e 4.
- D) Apenas 2 e 3.

---

**Questão 21**

Em relação às características clínicas e fisiopatológicas da asfixia perinatal, assinale a opção **incorreta**.

- A) Vasoconstrição pulmonar.
- B) Aumento da glicogenólise.
- C) Aumento do débito cardíaco.
- D) Edema cerebral.

**Questão 22**

Em relação ao diabetes mellitus neonatal transitório, assinale a opção **incorreta**.

- A) Os achados mais comuns são hiperglicemia, poliúria, desidratação grave, glicosúria e acidose.
- B) O tratamento consiste em hidratação e insulina regular.
- C) Acomete geralmente recém-nascidos grandes para a idade gestacional.
- D) Pode ser secundária a uma maturação retardada ou anormal das células B.

**Questão 23**

Assinale a opção **incorreta** em relação ao diagnóstico diferencial entre tremores e convulsão no recém-nascido.

- A) Na convulsão, os movimentos cessam com suave flexão passiva do membro.
- B) Nos tremores, os reflexos tendinosos estão aumentados.
- C) Nas convulsões, ocorre desvio ocular.
- D) Os tremores são desencadeados por estímulos periféricos.

**Questão 24**

A administração prolongada de sulfato de magnésio à mãe pode produzir problemas no recém-nascido. Assinale qual dos distúrbios abaixo pode ser provocado por essa administração.

- A) Hipertonia e hiperreflexia.
- B) Síndrome da rolha meconial.
- C) Hemorragia intraventricular.
- D) Anemia hemolítica.

**Questão 25**

Em relação à síndrome de transfusão feto-fetal, assinale a opção **incorreta**.

- A) O diagnóstico é feito quando os gêmeos mostram uma diferença de hemoglobina superior a 5mg/dL.
- B) O gêmeo receptor desenvolverá policitemia e polihidrâmnio.
- C) As anastomoses são artério-venosas.
- D) O gêmeo doador poderá desenvolver hipervolemia e hidropsia.

---

### Questão 26

Em relação à hiperbilirrubinemia neonatal, assinale a opção **correta**.

- A) A icterícia observada na mucoviscidose deve-se à deficiência da excreção hepática da bilirrubina conjugada.
- B) A icterícia observada no hipotireoidismo congênito deve-se à hiper-hemólise.
- C) A icterícia observada na esferocitose deve-se à deficiência de captação da bilirrubina ao nível do hepatócito.
- D) A icterícia da hipoglicemia deve-se à hiper-hemólise.

### Questão 27

Sobre a reanimação neonatal, é **correto** afirmar que

- A) a profundidade correta da massagem cardíaca é cerca de um quarto do diâmetro antero-posterior do tórax.
- B) a prioridade na reanimação do recém-nascido fora do período neonatal imediato é a administração de adrenalina e massagem cardíaca.
- C) a presença de bradicardia e cianose persistentes durante a reanimação é, em geral, causada por condições cardíacas.
- D) a técnica preferível para realização da massagem cardíaca é a dos polegares.

### Questão 28

Em relação à varicela no período neonatal, assinale a opção **incorreta**.

- A) A varicela contraída pela mãe, uma a três semanas antes do nascimento, causa varicela disseminada no neonato.
- B) A síndrome da varicela congênita caracteriza-se pela presença de lesões cicatriciais na pele, atrofia muscular e membros hipoplásicos.
- C) A varicela de aquisição neonatal é definida como varicela de início após dez dias de vida, tendo geralmente evolução branda.
- D) A varicela contraída pela mãe, cinco dias antes e dois dias após o parto, causa varicela grave no recém-nascido.

### Questão 29

Em relação ao refluxo gastro-esofágico, assinale qual o meio diagnóstico considerado padrão ouro para seu diagnóstico.

- A) Esofagograma.
- B) Cintilografia.
- C) PHmetria de 24 horas.
- D) Endoscopia digestiva e biopsia esofágica.

---

### Questão 30

Em relação à incidência da disfunção multiorgânica causada pela asfixia perinatal, assinale o órgão mais frequentemente acometido.

- A) Sistema nervoso central.
- B) Rins.
- C) Coração.
- D) Pulmão.

### Questão 31

Em relação à hipocalcemia no período neonatal, é **incorreto** afirmar que

- A) o hipoparatiroidismo transitório é causa de hipocalcemia precoce.
- B) a prematuridade é a causa mais freqüente de hipocalcemia neonatal precoce.
- C) a idade gestacional parece ser mais importante que o peso de nascimento na homeostasia do cálcio.
- D) o diabetes materno não adequadamente controlado é um importante fator de risco para hipocalcemia neonatal.

### Questão 32

Segundo o protocolo da Associação Americana de Bancos de Sangue e Comitê Britânico para padronização em Hematologia, em situações específicas, é necessário cuidados especiais na utilização de componentes celulares do sangue. Em qual das situações abaixo a irradiação prévia do sangue, objetivando minimizar a reação enxerto-hospedeiro, estaria indicada **incorretamente**.

- A) Recém-nascidos que apresentaram reações febris após a administração de sangue.
- B) Recém-nascidos que receberam transfusões intra-uterinas.
- C) Recém-nascidos com peso inferior a 1500 gramas.
- D) Recém-nascidos portadores de imunodeficiências congênitas tipo celular.

### Questão 33

Os recém-nascidos filhos de mãe diabética apresentam inúmeras manifestações clínicas. A esse respeito, é **incorreto** afirmar que

- A) cerca de 5 a 17% dos recém-nascidos apresentam insuficiência cardíaca.
- B) a cardiomegalia é devida basicamente à dilatação das câmaras cardíacas e não à hipertrofia do miocárdio.
- C) a hipoglicemia está presente em cerca de 50% dos recém-nascidos, mais freqüentemente nos macrossômicos e nas primeiras duas horas de vida.
- D) a incidência de hipocalcemia e hipomagnesemia pode ser de até 50% e está relacionada com a severidade do diabetes materno, idade gestacional, asfixia perinatal e diminuição da função da glândula paratireóide.

---

### Questão 34

No exame neurológico evolutivo de um recém-nascido com 32 semanas de idade gestacional, é **incorreto** afirmar:

- A) preensão palmar com reação tônica difunde-se dos flexores dos dedos para o punho, antebraço e braço.
- B) em relação à motilidade, surge a participação ativa dos músculos do tronco, com rolamento e encurvamento lateral. O relaxamento do tônus passivo contrasta com o início do tônus ativo.
- C) a pesquisa do tônus muscular nos membros inferiores revela ângulo poplíteo em torno de 110 graus, calcânhar-orelha com pequena resistência e ângulo pé-perna de 30 graus.
- D) no alongamento cruzado, o primeiro tempo (flexão) é apenas esboçado; o segundo tempo (extensão) é demasiado prolongado.

### Questão 35

No diagnóstico diferencial das infecções congênitas, é **incorreto** afirmar que

- A) a freqüência da transmissão da toxoplasmose é de 65% no terceiro trimestre.
- B) as crianças infectadas pelo citomegalovírus (CMV) são assintomáticas em 90% dos casos.
- C) as crianças infectadas pelo herpes simples são geralmente sintomáticas.
- D) as lesões da rubéola congênita são mais freqüentes após a vigésima semana de gestação.

### Questão 36

Quais os fatores da coagulação que estão envolvidos na doença hemorrágica do recém-nascido por deficiência de vitamina K?

- A) Fatores VII, IX, XI e XII.
- B) Fatores V e X.
- C) Fatores II, VII, IX e X.
- D) Fatores VIII e IX.

### Questão 37

Em relação à icterícia do leite materno, assinale opção **correta**.

- A) Os níveis séricos de bilirrubina aumentam com a freqüência das mamadas.
- B) Incide em 1 a 2% dos recém-nascidos amamentados ao seio.
- C) Geralmente os níveis séricos de bilirrubina persistem acima de 20mg% por 3 a 4 semanas.
- D) A incidência é maior em recém-nascidos macrossômicos filhos de mãe diabética.

---

**Questão 38**

Qual a conduta em recém-nascido cuja genitora tem tuberculose pulmonar e ainda não iniciou o tratamento?

- A) Manter aleitamento materno, vacinar com BCG intra-dérmico e iniciar isoniazida.
- B) Manter aleitamento materno e iniciar isoniazida.
- C) Manter aleitamento materno e vacinar com BCG intra-dérmico
- D) Suspender aleitamento materno e vacinar imediatamente com BCG intra-dérmico.

**Questão 39**

Um recém-nascido, amamentado exclusivamente ao seio materno e que apresenta oito evacuações diárias com fezes líquidas e explosivas, deverá estar apresentando

- A) deficiência transitória de lactase.
- B) infecção intestinal aguda.
- C) intolerância à proteína do leite materno.
- D) reflexo gastro-cólico exacerbado.

**Questão 40**

O íleo meconial primário em recém-nascidos é mais freqüentemente causado por

- A) intusseção do cólon.
- B) polidrâmnio.
- C) mucoviscidose.
- D) atresia de íleo terminal.

